


MELÓN PIEL DE SAPO INVERNADERO



VALENTÍN F1

- Piel de sapo de ciclo medio-temprano y precoz.
- Planta fuerte con excelente cuaje y agrupado.
- Frutos uniformes en calibre (2,5 a 3,0 Kg) y forma, con escriturado fino pero intenso.
- Carne blanca, crujiente, sin hebras, de buen sabor.
- Excelente post- cosecha.

HR a Fom:0,1 y MNSV. **IR** a Px: 1,25.

MIRAMBEL F1

- Piel de sapo de ciclo medio-tardío y buena precocidad.
- Planta fuerte y vigorosa que cuaja con facilidad y de forma concentrada.
- Frutos que escrituran bien, y son uniformes en calibre (2,2 a 2,7 Kg) y forma.
- Buena calidad organoléptica, de carne blanca muy dulce y crujiente.
- Gran conservación.

HR a Fom:0,1 y MNSV. **IR** a Px: 1,2.



MELÓN PIEL DE SAPO INVERNADERO



Calendario para trasplante

Zona de Almería

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Quincena	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
VALENTÍN F1	■	■	■									■
MIRAMBEL F1		■	■	■	■							

Zona del sur de España con excepción de Almería

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Quincena	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
MIRAMBEL F1		■	■									

■ fecha óptima de recolección ■ fecha óptima de trasplante ■ trasplante según condiciones

Fom: 0, 1: Fusarium oxysporum f. sp. melonis según raza, MNSV: Melon Necrotic Spot Virus (Virus del Cribado del Melón), Px:1,2: Podosphaera xanthii razas 1, 2, 5 (Oídio)

Para conocer con exactitud la definición y el alcance de las resistencias consulten la página web de Ramiro Arnedo S.A.: www.ramiroarnedo.com y/o el personal técnico de la empresa.

Importante: Todas las descripciones y datos mostrados están basadas en observaciones y ensayos del personal técnico de Ramiro Arnedo S.A., y pueden diferir según las condiciones de cultivo. En este sentido no constituyen garantía alguna de resultado.